

RESAQUIT®

ACIDO ACETILSALICILICO - CAFEINA - HIDROXIDO DE ALUMINIO - HIDROXIDO DE MAGNESIO - PARACETAMOL

Comprimidos

Industria Argentina

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene RESAQUIT®?

Cada comprimido bicapa contiene:

Acido acetilsalicílico	255,22 mg
Paracetamol	194,00 mg
Cafeína anhidra	33,00 mg
Hidróxido de aluminio	25,00 mg
Hidróxido de magnesio	50,00 mg

Excipientes: Cada comprimido contiene: Almidón de maíz: 15,09 mg; Povidona: 3,23 mg; Almidón Glicolato de sodio: 2,16 mg; Acido esteárico: 1,08 mg; Povidona: 1,72 mg; Oxido de hierro negro: 0,08 mg; Croscarmelosa sódica: 10,00 mg; Estearato de magnesio: 1,00 mg; Celulosa microcristalina pH 200: 18,55 mg; Colorante tartrazina: 0,20 mg; Croscarmelosa sódica: 10,65 mg; Celulosa microcristalina pH 200: 33,00 mg; Almidón pregelatinizado: 49,36 mg; Estearato de magnesio: 10,00 mg; Povidona: 8,52 mg.

Acción Terapéutica:
Analgésico. Antiácido.

¿Qué personas no pueden recibir RESAQUIT®?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al paracetamol, al ácido acetilsalicílico u otros componentes del medicamento; en presencia de trastornos hemorrágicos (sangrado); en presencia de úlceras gástricas o duodenales, problemas de hígado, corazón o riñones.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones en la piel, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.

Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener *antes* de tomar este medicamento?

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico. No administrar en menores de 15 años en caso de SÍNTOMAS DE GRIPE o VARICELA ya que puede incremen-

tar el riesgo de desarrollar complicaciones severas. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted toma otros medicamentos como anticoagulantes, medicación para la diabetes, para el corazón, antiépilépticos o antiinflamatorios, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

Si Ud. está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener *mientras* estoy tomando este medicamento?

Este medicamento puede producir taquicardia (aumento del número de latidos del corazón), nerviosismo, insomnio, estimulación del sistema nervioso central, temblor. Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas (disminución de plaquetas).

¿Cómo se usa RESAQUIT®?

En adultos y mayores de 15 años: un comprimido cada 6 horas, por vía oral, con un vaso de agua o jugo de frutas. Dosis máxima: 4 comprimidos por día. No tomar por más de 2 (dos) días.

Si los síntomas de malestar y cefalea persisten por más de 2 días de tratamiento con RESAQUIT, consultar al médico.

¿Qué debo hacer si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Niños R. Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

**ESTE MEDICAMENTO CONTIENE TARTRAZINA
COMO COLORANTE**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**ANTE CUALQUIER DUDA
CONSULTE CON SU MEDICO O FARMACEUTICO**

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

Presentaciones:

RESAQUIT® se presenta en envases con 12 comprimidos bicapa.

**No utilizar este medicamento luego de la fecha
de vencimiento.**

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud
Certificado N° 55.018.



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sársfield 5855
B1606 ARI Carapachay
Directora Técnica:
Daniela A. Casas, Farm. y Bioq.

Última revisión del prospecto: 29/4/2013

**36945/2
P177**